Fonctions périodiques.

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et T un réel strictement positif. On suppose que $\forall x \in E, x + T \in E$.

Définition	f est une fonction T – périodique lorsque $\forall x \in E, f(x + T) = f(x)$
Exemple	<p>La fonction $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \rightarrow \sin x \end{cases}$ est 2π – périodique. Cela signifie que $\forall x \in \mathbb{R} \sin(x + 2\pi) = \sin x$</p> <p>Visuellement cela signifie que la courbe se répète tous les 2π</p>
Propriété	Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction T – périodique $\forall k \in \mathbb{Z}, f(x + kT) = f(x)$
Preuve	Une simple récurrence sur k peut nous en convaincre.
Remarque	La propriété précédente nous renseigne sur le fait qu'une fonction possède toujours une infinité de périodes. (Si elle est T – périodique elle est aussi $2T$ – périodique). Il vaut donc mieux parler d' une période de la fonction f plutôt que de la période.
Théorème	Soient f et g deux fonctions T – périodiques sur un ensemble E . Les fonctions $h : x \rightarrow f(x)g(x)$, $i : x \rightarrow f(x) + g(x)$ et $j : x \rightarrow \frac{f(x)}{g(x)}$ (lorsque g ne s'annule pas) sont aussi T – périodiques.
Preuve	
$h(x + T) = f(x + T)g(x + T) = f(x)g(x) = h(x)$ $i(x + T) = f(x + T) + g(x + T) = f(x) + g(x) = i(x)$ $j(x + T) = \frac{f(x + T)}{g(x + T)} = \frac{f(x)}{g(x)} = j(x)$	
Exemple	La fonction $x \rightarrow \sin x * \cos x$ est 2π périodique.
Théorème	Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction T – périodique Soit ω un réel et $h :$ la fonction $x \rightarrow f(\omega x)$. Cette fonction est définie sur l'ensemble E' défini par $\forall x \in E', \exists y \in E$ tel que $x = \frac{y}{\omega}$ Alors la fonction h est $\frac{T}{\omega}$ – périodique.
Preuve	
$\forall x \in E' h\left(x + \frac{T}{\omega}\right) = f\left(\omega\left(x + \frac{T}{\omega}\right)\right) = f(\omega x + T) = f(\omega x) = h(x)$	
Exemple	La fonction $x \rightarrow \sin 2x$ est $\frac{2\pi}{2}$ – périodique soit π – périodique
Remarque	Il ne sert à rien d'étudier une fonction T – périodique sur $\mathbb{R}$. Il suffit de l'étudier sur un intervalle de longueur T . Le reste de l'étude se déduit par translation.