Intégrale d'une fonction continue par morceaux

**Définition
Propriété**

Soit f une continue par morceaux définie sur $[a, b]$ segment de $\mathbb{R}$ et à valeur dans $\mathbb{C}$.
Soit $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions en escalier convergeant uniformément vers f sur $[a, b]$
Alors la suite $\int_a^b \varphi_n(t) dt$ converge et sa limite ne dépend que de f et pas de φ_n .
Cette limite est appelée **intégrale** de f sur $[a, b]$ et est notée $\int_a^b f(t) dt$

Remarque

Sur le schéma ci-contre nous avons approché une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$ par une fonction en escalier. La subdivision de l'intervalle avec $n = 6$ nous donne une approximation grossière de f . Lorsque n va augmenter, les rectangles seront plus étroits et recouvriront de plus en plus parfaitement la zone comprise entre l'axe des abscisse et la courbe.

Nous pouvons donc ainsi conjecturer que si φ_n est une suite de fonctions en escalier convergeant vers f , la limite de $\int_a^b \varphi_n(t) dt$ aussi appelée $\int_a^b f(t) dt$ correspond à l'aire de la zone située entre l'axe des abscisses et la courbe.

Preuve

- 1ere étape : Montrons que si $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de fonctions en escalier convergeant uniformément vers f sur $[a, b]$ alors $\left(\int_a^b \varphi_n(t) dt\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

$$\left| \int_a^b \varphi_n(t) dt \right| \leq (b-a) \|\varphi_n\|_\infty \leq (b-a) \|\varphi_n - f + f\|_\infty \leq (b-a) \|\varphi_n - f\|_\infty + (b-a) \|f\|_\infty$$

Nous savons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\varphi_n - f\|_\infty = 0$; donc $\exists N$ tel que $\forall n \geq N \|\varphi_n - f\|_\infty \leq 1$

Nous avons donc $\forall n \geq N \left| \int_a^b \varphi_n(t) dt \right| \leq (b-a) + (b-a) \|f\|_\infty \leq (b-a)(1 + \|f\|_\infty)$

La suite $\int_a^b \varphi_n(t) dt$ est donc bornée.

D'après le théorème de Bolzano Weierstrass, il existe une suite extraite de $\left(\int_a^b \varphi_n(t) dt\right)_{n \in \mathbb{N}}$ convergente.

Soit $\left(\int_a^b \varphi_{\psi(n)}(t) dt\right)_{n \in \mathbb{N}}$ cette suite.

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \varphi_n(t) dt - \int_a^b \varphi_{\psi(n)}(t) dt \right| &= \left| \int_a^b \varphi_n(t) - \varphi_{\psi(n)}(t) dt \right| \leq (b-a) \|\varphi_n - \varphi_{\psi(n)}\|_\infty \\ \left| \int_a^b \varphi_n(t) dt - \int_a^b \varphi_{\psi(n)}(t) dt \right| &\leq (b-a) \|\varphi_n - f\|_\infty + (b-a) \|f - \varphi_{\psi(n)}\|_\infty \end{aligned}$$

Par hypothèse $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\varphi_n - f\|_\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} \|\varphi_{\psi(n)} - f\|_\infty = 0$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \int_a^b \varphi_n(t) dt - \int_a^b \varphi_{\psi(n)}(t) dt \right| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n(t) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_{\psi(n)}(t) dt$

Nous avons donc montré que la suite $\left(\int_a^b \varphi_n(t) dt\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge

- 2ème étape : Montrons que la limite de cette suite ne dépend pas de φ_n mais seulement de f

Soit $(\psi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une autre suite de fonctions convergeant vers f

$$\left| \int_a^b \varphi_n(t) dt - \int_a^b \psi_n(t) dt \right| = \left| \int_a^b \varphi_n(t) - \psi_n(t) dt \right| \leq (b-a) \|\varphi_n - \psi_n\|_\infty \leq (b-a) \|\varphi_n - f\|_\infty + (b-a) \|f - \psi_n\|_\infty$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \|\varphi_n - f\|_\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} \|\psi_n - f\|_\infty = 0$ par hypothèse.

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_n(t) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \psi_n(t) dt$.

La limite de l'intégrale de deux suites de fonctions convergeant vers f est donc identique. Quelque soit la suite de fonction convergeant uniformément vers f , la limite de son intégrale ne dépend que de f .