Critère de Riemann, Séries à termes positifs.

Théorème

Séries de Riemann
Soit $\alpha \in \mathbb{R}$

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge ssi $\alpha > 1$. Ce critère est appelé critère de Riemann.

Preuve

Remarquons déjà que lorsque $\alpha \leq 0$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^\alpha} \neq 0 \Rightarrow$ divergence grossière de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$

Nous avons aussi vu que $\alpha = 1$ entraîne la divergence de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$

Envisageons donc le cas $\alpha \in \mathbb{R}^{++} - \{1\}$

Nous avons déjà vu sur la preuve de la convergence de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$; qu'il était possible de lier l'étude de la convergence de $\sum_{k=1}^n f(k)$ avec celui de $\int_1^n f(t) dt$ lorsque f est continue et montone.

Ici nous nous intéresserons à $f: \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}^{++} \rightarrow \mathbb{R}^{++} \\ x \rightarrow \frac{1}{x^\alpha} \end{array} \right\}$;

La décroissance de cette fonction nous donne :

$$\int_1^2 f(t) dt \geq f(2) \geq \int_2^3 f(t) dt \text{ (voire schéma joint avec } \alpha = 2)$$

$$\dots$$

$$\int_{n-1}^n f(t) dt \geq f(n) \geq \int_n^{n+1} f(t) dt$$

En additionnant terme à terme ces inégalités il vient :

$$\int_1^n f(t) dt \geq \sum_{k=1}^n f(k) \geq \int_2^{n+1} f(t) dt$$

$$\int_1^n \frac{1}{t^\alpha} dt \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \geq \int_2^{n+1} \frac{1}{x^\alpha} dx$$

$$\left[\frac{t^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_1^n \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \geq \left[\frac{t^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_2^{n+1}$$

$$\frac{1}{1-\alpha} \left[\frac{1}{n^{\alpha-1}} - 1 \right] \geq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \geq \frac{1}{1-\alpha} \left[\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{2^{\alpha-1}} \right]$$

- $\alpha \in]0; 1[\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-\alpha} \left[\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{2^{\alpha-1}} \right] = +\infty$

Donc en posant $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$; $(S_n)_{n \geq 1}$ est donc minorée par une suite tendant vers $+\infty$. On en déduit sa divergence

- $\alpha > 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-\alpha} \left[\frac{1}{n^{\alpha-1}} - 1 \right] = \frac{1}{\alpha-1}$ Donc $(S_n)_{n \geq 1}$ est majorée.

$(S_n)_{n \geq 1}$ étant croissante ($S_{n+1} - S_n = \frac{1}{(n+1)^\alpha}$) nous en déduisons sa convergence.

Théorème

Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite à termes réels positifs.

$\sum_{n \geq 0} u_n$ converge ssi $(S_n)_{n \geq 0}$ définie par $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ est majorée.

Preuve

$S_{n+1} - S_n = u_{n+1}$ et $u_{n+1} \geq 0$ donc $(S_n)_{n \geq 0}$ est croissante. Une suite croissante converge ssi elle est majorée.

Théorème

Soient $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ deux suites réelles telles que $0 \leq u_n \leq v_n$ à partir d'un rang n_0
Alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} v_n$ diverge et $\sum_{n \geq 0} v_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ converge

Preuve

Il suffit de se replacer dans le monde des suites.

Soient $(U_n)_{n \geq n_0}$ et $(V_n)_{n \geq n_0}$ deux suites définies par $U_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$ et $V_n = \sum_{k=n_0}^n v_k$

$\forall n \geq n_0$ $0 \leq u_n \leq v_n$ donc $0 \leq U_n \leq V_n$;

$\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = +\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = +\infty \Rightarrow \sum_{n \geq 0} v_n$ diverge

$\sum_{n \geq 0} v_n$ converge $\Rightarrow \sum_{k=n_0}^\infty u_k \leq \sum_{k=n_0}^\infty v_k$; $(U_n)_{n \geq n_0}$ étant croissante (termes positifs) et majorée converge $\Rightarrow \sum_{n \geq 0} u_n$ converge.

Exemple

Soient $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ deux suites définies par $u_n = \frac{1}{((-1)^n \cos n + 3n^2)}$ et $v_n = \frac{e^{(-1)^n}}{\sqrt{n}}$
 $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge et $\sum_{n \geq 1} v_n$ diverge

Preuve

$\forall n \geq 1$ $0 \leq \frac{1}{((-1)^n \cos n + 3n^2)} \leq \frac{1}{(3n^2 - 1)} \leq \frac{1}{(3n^2 - n^2)} \leq \frac{1}{2n^2}$; $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{2n^2}$ converge donc $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge aussi

$\forall n \geq 1$ $0 \leq \frac{e^{-1}}{\sqrt{n}} \leq \frac{e^{(-1)^n}}{\sqrt{n}}$; $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{-1}}{\sqrt{n}}$ diverge (critère de Riemann) donc $\sum_{n \geq 1} v_n$ diverge aussi

Théorème	Soient $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ deux suites réelles strictement positives telles que $u_n \sim v_n$ en l'infini alors $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq 0} v_n$ sont de même nature
Preuve	
$u_n \sim v_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1 \Rightarrow \exists n_0 \text{ tq } \forall n \geq n_0 \frac{u_n}{v_n} \leq 2 \Rightarrow \forall n \geq n_0 0 \leq u_n \leq 2v_n$	
L'application du théorème précédent aux suites $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(2v_n)_{n \geq 0}$ nous donne le résultat final.	
Exemple	<p>Reprenons l'exemple précédent avec $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par $u_n = \frac{1}{((-1)^n \cos n + 3n^2)}$; $\forall n \geq 1, u_n > 0$</p> <p>$u_n = \frac{1}{3n^2} * \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n \cos n}{3n^2}} \Rightarrow u_n \sim \frac{1}{3n^2} (en + \infty)$ donc la convergence de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{3n^2}$ (critère de Riemann) entraîne la convergence de $\sum_{n \geq 1} u_n$</p>